

嵐剤耐性いもち病菌対策について

今年、嵐剤に耐性のあるいもち病菌の発生が確認されました。このため来年度からは、嵐剤に頼らない防除体系で育苗期防除と本田葉いもち病防除を行う必要があります。

耕種的防除

本田におけるいもち病発病の主な原因は、育苗施設からの発病・感染苗の本田への持ち込みです。また、乾燥状態で冬を越した稲わら・籾殻も伝染源になります。

育苗施設の近傍や施設内に伝染源となる稲わら・籾殻を置かないようにし清潔な環境で育苗管理を行いましょう。また、育苗施設内の通風不良、日照不足、被覆期間の過剰、過繁茂、田植の遅延は発病を招きますので注意が必要です。補植用余り苗はいもち病が発病しやすく、伝染源になりやすいので補植後は泥に埋めて処分しましょう。

苗立枯病予防

嵐剤はピシウム菌（ムレ苗）による苗立枯病に対して有効でした。対策として、床土に焼土や人工培土を使用しない場合はタチガレエースM剤を使用しましょう。また、過かん水などによって育苗ハウス内が蒸れることは発生を助長するので、換気などによって蒸れない温度管理を徹底しましょう。

苗いもち防除と箱処理剤で葉いもちの発生を抑えましょう


種子消毒を必ず行いましょう。防除効果を高めるために浸種水温は10℃～15℃になるように努めましょう。

箱処理剤はいもち病に対して「予防効果」しかありませんので、育苗期ではベンレート水和剤かビームゾルで必ず苗いもち防除を行いましょう。箱処理剤は使用時期が剤によって異なりますので自分の作業体系にあった剤を選択しましょう。使用時期を間違えた場合は薬害を生じてしまいますので確認が必要です。

箱処理剤を使用しない場合は側条施用剤やオリゼメート剤を散布しましょう。その後、必要に応じて本田葉いもち防除をしましょう。

紋枯病についても近年発病しているほ場が散見されますので紋枯病予防剤入りの箱処理剤を使用するか本田防除でモンカット剤を散布しましょう。

防除体系 図



平成27年度 総括版

稲作生育概況 仙北地域振興局農業振興普及課水稻定点調査結果より

【育苗期】～雪消え早く、春先から高温～

本年は3月末に雪消えとなり、その後も好天が続いたことでは場の乾きが良く、耕起作業の盛期は5月3日（平年5月7日）と早まりました。

播種作業の盛期は4月23日（平年4月24日）でした。育苗期間（4月23日～5月23日）は平均気温15.1℃（平年差+2.0℃）、降水量54.5mm（平年比46%）、日照時間は238時間（同135%）でした（アメダス大曲）。育苗期前半の過度な高温による苗ヤケや籾枯細菌病、乾燥による葉先枯れ等が見られました。

【田植期】～活着、生育は良好～

田植え盛期は5月23日（平年5月24日）と平年並でした。移植後は気温も高く、苗の活着に良好な気象条件でした。しかし、この時期は風の強い日が多く、深水管理が続いた影響等により茎数は6月10日時点で131本/㎡（平年比90%）と少なく、強風による植え痛みも散見されました。7月以降は高温多照、気温の日較差が大きい日が続き、分けつは旺盛になりました。7月15日の定点調査結果に基づく栄養診断では、Ⅳ型（籾数やや多い）やⅤ-2型（生育過剰）に該当する地点が多い結果となりました。

【出穂～刈取り期】～登熟後半に低温続くも、登熟はやや良～

出穂期は8月1日（平年8月4日）でした。出穂直後は高温・多照の日が続き、高温登熟が心配されましたが、8月中旬～9月中旬は低温で推移し、登熟は緩慢となりました。しかし、9月中旬からは天候も回復し、結果的に登熟はやや良好となりました。倒伏程度は平年よりすくない0.2（平年0.5）でした。

刈取り始期は9月22日（平年9月21日）となり、その後は一時的に雨の日もありましたが、刈り取り作業はほぼ順調に進み、盛期は平年並の9月30日（平年9月30日）となりました。

作柄概況

～県南地域の作況指数は「103」、収量は597kg/10a～

平成27年10月30日に東北農政局秋田地域センターが公表した資料によると、秋田県の米の収量は589kg/10aで作況指数103、県南地域の収量は597kg/10aで作況指数103となりました。

～総籾数は平年並、穂数が多い（定点調査ほ）～

水稻定点調査ほの玄米収量は609kg/10a（篩い目1.9mm）で平年よりやや多い結果（平年比104%）となりました。収量構成要素（下表参照）は、㎡あたりの穂数は多く、1穂粒数は少なく、総籾数は平年並となりました。登熟歩合、千粒重はいずれも平年並みであり、結果的に10aあたり玄米重は609kg/10aとなっています。また、J A秋田おばこの12月9日現在の1等米比率は97.8%となっています。

表 定点収量及び収量構成要素（あきたこまち、管内10地点）

	玄米重 kg/10a	穂数 本/㎡	1穂籾数 粒/穂	総籾数 粒/㎡	登熟歩合 %	千粒重 g/千粒
本年	609	495	63.3	31,240	88.7	22.5
平年比(%±)	104%	113%	89%	101%	+1.7	100%
前年比(%±)	103%	102%	91%	93%	+10.7	98%

