



でああなたの手元に届くwebマガジン

おばこ稲作情報



2022年6月
No. 2 9-1

JA秋田おばこ



Youtube
はじめました



チャンネル登録
お願いします

1:35/3:40

中干しを

始めましょう

時期です。中干しが遅くなりすぎないようにしましょう。

6月24日(有効茎決定期)のJA生育調査結果では、草丈、茎数ともに目標値まで回復してきています。ただ、田植え日が5月20日頃までに植えたところとそれ以降の田植えで生育差が大きくなっています。自身の田んぼを必ず確認して中干しに向いましょう。
梅雨空となる天気予報です。落水後すぐには乾きにくい天気ですので、余裕をもって中干しに移行してください。
今は中干しに入るべき

有効茎決定期目標茎数 346本/m ² の目安	
栽植密度	株あたり茎数
70株	16本
60株	19本
50株	23本

6/24	草丈(cm)		茎数(本/m ²)		葉色(SPAD)		葉数(葉)	
	計測値	目標値比(34cm)	計測値	目標値比(346本)	計測値	目標値比(43)	計測値	目標値比(8.4葉)
大仙市中央	30.4	89.4%	356.0	102.9%	48.4	112.6%	8.0	95.2%
大仙市西部	32.3	95.0%	241.0	69.7%	48.5	112.8%	8.4	100.0%
大仙市東部	30.7	90.3%	303.0	87.6%	44.2	102.8%	7.4	88.1%
仙北市	44.1	129.7%	569.1	164.5%	43.9	102.1%	8.9	105.8%
美郷町	33.7	99.1%	328.0	94.8%	44.9	104.4%	8.5	101.2%
おばこ平均	34.2	100.7%	359.4	103.9%	46.0	106.9%	8.2	98.1%
R3平均	36.38	107.0%	359.1	103.8%	44.4	103.3%	8.32	99.0%



今週は雨が多いうえ気温が25〜30度くらいの日が続くようです。こんな蒸れるような日には、いもち病が発生しやすくなります。葉色が濃い、肥料や苗が重くなって見えているところは要注意。病斑が見えだすのは、7月10日頃から？要注意です！
田んぼに放置されている補植用余り苗は速やかに廃棄してください。
蒸し蒸しムレムレした日が続くといった間に感染拡大しますので、田んぼの定期的な見回りと警戒をお願いします。

いもち病警戒を

LINE公式アカウント
「@ja-obako」で検索
稲作情報発信中！



ガラケーでも！
メルマガも始めました
稲作情報があなたの手元に！



WCS・飼料用米も いもち病防除の徹底を

昨年はいもち病が多発した地域があり、その地域を中心に今年も警戒を強めてください。種子消毒や育苗期いもち病防除、箱処理剤を使用すれば安心感が大きいです。天候や施肥等によつては発生するので油断禁物。

いもち病は一度発生するとあつという間に広がり、広がってから食い止めるのは至難の業。むしろ無理と思つてよいです。省力化低コスト化が至上命題ですが、防除しなければならぬものは手間でも必ず行つてくたさい。WCSや飼料用米、業務用米に取り組まれる方で、育苗期防除を忘れた、箱処理剤を撒いていないという場合は、必ずオリゼメート粒剤などを散布する地域でも本田防除を必ず行つて、いもち病が広がらないようにしましょう。

【主ないもち病防除剤】

薬剤名	使用量	使用方法	使用時期	WCS
オリゼメート粒剤	3~4kg/10a	散布	葉いもち 初発の10日前~	○
コラトップ1キロ粒剤12	1~1.5kg/10a			○
コラトップ豆つぶ	250~375g/10a			○
コラトップ粒剤5	3~4kg/10a			○
ブラシン粉剤DL	3~4kg/10a		収穫7日前まで	○
ブラシンフロアブル	1,000倍60~150L/10a			○
ラブサイドフロアブル	1,000~1,500倍60~150L/10a			○
トライフロアブル	1,000倍60~150L/10a			○
			収穫14日前まで	○

飼料用米の防除について（秋田県病害虫雑草防除基準より）

- ①移植水稻と同じ防除でOK。
- ②出穂以降に農薬散布を行う場合には、家畜へは粃すりをして玄米で給与すること。
- ③粃米を家畜に給与する場合は、出穂以降の農薬の散布は控えること。
- ④ただし、以下の農薬については、上記の措置を必要としない。

殺菌剤

オリゼメート粒剤、バンタック水和剤75、バンタックブル、モンカット水和剤、モンカットファイン粉剤20DL、モンカットフロアブル、モンガリット粒剤、リンバー粒剤

殺虫剤

アブロード水和剤、アルバリン粉剤DL、アルバリン粒剤、エルサン乳剤、エルサン粉剤3DL、キラップフロアブル、キラップ粉剤DL、スタークル液剤10、スタークル粉剤DL、スタークルメイト液剤10、スタークル粒剤、トレボンEW、トレボン乳剤、トレボン粉剤DL、トレボン粒剤、パッサ粉剤30DL、MR.ジョーカーEW、MR.ジョーカー粉剤DL

なお、上記薬剤でも食用稲と異なる時期(黄熟期等)に収穫する場合は、②、③の農薬残留の提言措置を講じること。

おばこ稲作情報

LINE
でああなたの手元に届くwebマガジン

2022年6月
No. 2 9-2

JA秋田おばこ



Youtube
はじめました



チャンネル登録
お願いします

1:35/3:40

LINE公式アカウント
「@ja-obako」で検索
稲作情報発信中！



ガラケーでも！
メルマガも始めました
稲作情報があなたの手元に！

