

白の衝撃

雑草を白く、
早く枯らせます！

バイスコープ

1キロ粒剤

水を張って使えるバサグランという位置づけです。ノビエには効果がありませんが、その他の広葉雑草対策にご使用ください。梅雨時期の水管理が難しい時期でも、水を張った状態で雑草対策ができるので安心です。効果が早く白く見える満足感もあり。

ただし、重複散布等をするとう稲が白くなる場合がありますので、使用量を守って使いましょう。

【特徴】

- ①サイラ×テフリルトリオンの相乗効果による強力な白化作用で、高葉令の雑草に対して高い枯殺力と残効が期待できる、新しいタイプの中・後期除草剤です。
- ②オモダカ、コナギ、ミズアオイに特に高い効果を発揮し、クログワイ、ホタルイ、シズイ等のカヤツリグサ科雑草にも高い効果を示します。
- ③イボクサ、クサネム等の特殊雑草にも有効です。
- ④湛水散布、ごく浅く湛水して散布のどちらも可能です。

重なると稲が白くなるけどその後回復するよ。
梅雨時だから豪雨でオーバーフローしないように天気も見ながら水深調整してね。

おばこ稲作情報

LINE
でああなたの手元に届くwebマガジン

2024年7月
No.5 3

JA秋田おばこ



作物名	適用雑草名	使用時期	10a 当り 使用量	総使用 回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草（ノビエを除く）、オモダカ、ホタルイ、クログワイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ	移植後14～60日 ただし、収穫45日 前まで	1kg	本剤1回	湛水散布、ごく浅く湛水して散布又は無人航空機による散布
直播水稲	一年生雑草（ノビエを除く）、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ	稲3葉期～出芽後 50日 ただし、収穫45日 前まで		シクロピリモレート剤 2回 テフリルトリオン剤 2回	湛水散布又は無人航空機による散布